

15. DİĞER BALIKLAR

Ön kısımlarda ele aldığımız sazan, turna, sudak, yayın, alabalık ve yılan balıkları dışında daha pek tatlı su balığı ülkemiz sularında yaşamaktadır. Bu türlerin avlanma şekli genelde sazan balığı avına benzer. Sadece balıkların iriliğine göre takım hazırlamak ve balıkların almayı tercih ettikleri yemler konusunda biraz bilgili olmak gerekmektedir. Her bir tür için burada daha detaylı bilgilere girme olanağı bulunmamaktadır. Fakat olta meraklılarının sazan ve diğer balık avları sırasında bu balıklara rastlama olasılıkları da vardır. Bu nedenle ülkemiz sularında bulunan bu balıklardan bazıları hakkında kısa bilgiler sunmakla yetineceğiz

GÖRDEK (*Rutilus rubilio*)



Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve Trakya'da fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler, kabuklular böcek ve sinek Larvalarıyla beslenir. Boyu 15–20, en çok 25 cm. olur. Nisan-Mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Besin yönüyle değersizdir, fakat av yemi olarak değerlidir.

BIYIKLI BALIK (*Barbus barbus*)



Genelde 30–50 cm. uzunlukta ve 0,5–2 kg. ağırlıkta olur. Büyüklerine seyrek rastlanır. Oksijeni bol hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölgelerinde yaşar. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. Mayıs–Haziran arasında üremelerini yapar ve 5.000–30.000 yumurta döker. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. Eti fazla değerli olmamakla beraber olta avcılığı yönünden değerli bir balıktır.

EĞREZ BALIĞI (*Vimba vimba*)



Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve göller bölgesinde yayılış gösterir. Düz ve ağır akışlı suların kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşar. Boyları 25–35 cm. en çok 50 cm. ve 450–500 gr. ağırlıkta olur. 3–4 yaşında olgunluğa erişip Mayıs–Haziran arası üreme yapar. Etinin beğenilmesi ve bolca avlanmasıyla ekonomik değeri vardır.

TAHTA BALIĞI (*Blicca bjoerkna*)



Marmara ve Trakya bölgesinde ağır akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. Göllerde de yaşam gösterir. Planktonlar, küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Mayıs–Temmuz arası üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3–5 yaşlarında 10–12 en çok 25–35 cm. olabilir. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Genelde Ekonomik balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır.

KIZILGÖZ (*Rutilus rutilus*)



Karadeniz, Trakya, Marmara ve Kuzeybatı Anadolu'nun sahil bölgelerindeki nehirlerinde yaşar. 25–30, en çok 50 cm. büyür. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Bahar aylarında ürer ve 50-100.000 yumurta bırakır. Eti değerli olmadığı için daha çok yem balığı olarak kullanılır.

ACIBALIK (*Rhodeus seiceus amarus*)



Trakya, Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Ortalama 5–6 en çok 30 cm. büyür. Üreme devresi Nisan–Haziran arasındır. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Erkek de spermlerini midyenin açılıp kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2–3 haftada olgunlaşan yavrular midyeyi terk eder. Böylece küçük cüsselerine rağmen, emniyetli üreme yöntemiyle ilginç doğa olayı tamamlanır.

TATLISU KOLYOZ BALIĞI (*Chalcalbum us chalcoides*)



Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in

doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar, zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acısu bölgelerine iner. Böylece acısu ve tatlı sular arasında göçler yapar. 15–30 cm. boyunda olabilir. Planktonlar, sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. Mayıs–Haziran arasında 15.000–25.000 yumurtasını taşlık, çakıllık dere kenarlarına bırakır. Yıllar öncesi “*Chalealburnus chalcoides fistanbulensis*” türü Haliç'te Kâğıthane deresinde yaşardı. Eti lezzetli, bölgesel değeri olan bir balıktır.

BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (*Gobius (Ponticola) kessleri*)



Trakya ve Karadeniz kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Boyları 12–18, en çok 22 cm. olur. Acısuların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp oradan nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır, buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Küçük kabuklular, balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Nisan–Mayıs arası dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır. Erkekler de gözcülük eder. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Ekonomik değeri bölgeseldir.


KADİFE BALIĞI (*Tinca tinca*)



Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. Genelde 30–40 cm., en çok 60–70 cm. olur. Planktonlar, küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. Mayıs–Haziran arası

üreme yapar. Eti lezzetlidir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. Sportif yönü zevklidir. Sazan avına benzer şekilde avlanabilir.

ÇAPAK BALIĞI (*Abramis brama*)



Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde, bazı türleri de Ankara ve Kırşehir yörelerinde yaşar. Boyları ortalama 30–40 cm.den 70 cm. ve 3 kg.dan 6 kg.a kadar ulaşabilir. Kurtlar böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir. Mayıs–Haziran arası yaklaşık 100.000 yumurta ile üreme yapar. 1 kg.ın üzerindeki etini lezzetlidir. Küçükleri ise av balığı olarak değerlidir.

İNCİ BALIĞI (*Alburnus alburnus*)



Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Boyları 15–20 cm. olur. Manyas ve Ulubat göllerinde bolca bulunur. Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Nisan–Mayıs arası üreyip yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır.

HAVUZ BALIĞI (*Carrasius carrasius*)



Trakya–Marmara bölgeleri, Kızılırmak, Yeşilırmak deltaları ve Çoruh havzasında yayılış

gösterir. Boyları 15–25 en çok 45 cm. ve 2–3 kg. ağırlıkta olur. Su içindeki otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenirler. Sazan'a benzer ve akrabadır. Mayıs–Haziran arası 14–20 derece sularda 150.000 – 300.000 yumurtasını otların üzerine bırakır. Suyun kirliliği ve Oksijen toleransına dayanıklı bir balıktır. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde üretimi yapılmaktadır. Akvaryumlar için renkli varyeteleri ve havuzlar da yetiştirilen Varyeteleri vardır.

NOKTALI İNCİ BALIĞI (*Alburnus bipunctatus*)



Karadeniz, Trakya ve Marmara'daki akarsularda yaygındır. Boyları 9–13 en çok 16 cm. olur. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında zaman zaman akıntıya karşı yüzerek yaşar. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Mayıs–Haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu, çakıllı sahil-lere bırakır. Olta avcılığında yem olarak kullanılır.

DERE PİSİSİ (*Pleuronectes flesus*)



Nehirlerin denizlere karışımı acı su bölgelerinde veya akarsuların daha içlerinde yaşayan bir Pisi türüdür. Akdeniz'de fazla rastlanır. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. Ortalama 25–30 en çok 50 cm. boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin

su ısına göre deęişik olarak Şubat–Mayıs arasında ürer ve 800.000 yumurta bırakır. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır.

BODUR YAYIN (*Ictalurus melas*)



Güneydoğu'daki akarsu ve göllerin kumlu çamurlu zeminlerinde yaşayan, 20–30 en çok 45 cm. boy ve 100–500 gr. ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir balıktır. Omurgasızlar, küçük balıklar, balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. Suların sıcaklık şartlarına göre Nisan–Haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.

KOCA AĞIZ (*Aspius aspius*)



Trakya, Marmara ve Kuzey bölgelerimizin

hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60–80 en çok 100 cm. boy ve 2–4 kg. dan 10 kg. a kadar büyüyebilirler. Etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenebilir. Erginleri yalnız dolaşır. Cinsel olgunluğa 4–5 yaşlarında ulaşır Nisan–Temmuz arasında 80.000–100.000 yumurta verir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomik değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan "Aps. vorax" türü Fırat ve Dicle nehirlerinde yaygındır. Sis balığı olarak tanınır. Boyları 40 cm. olabilir.

TATLISU KEFALİ (KASNA) (*Leuciscus Cephalus*)



Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı akan dere veya nehirlerde, 7–10 yaşlarında 30–40 cm. boy ve 600–1.000 gr. ağırlığa erişen bir Kefal türüdür. Yavru safhasında küçük kurtlar, karides ve böcek yavrularıyla beslenirken büyüyünce ot da yer. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelekleri yiyebilir. Nisan–Haziran arası 45.000–50.000 yumurta dökerek ürer. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşı avcılığı çok makbuldür. Yalnız çevre bölgelerde tuzlama yolu ile tüketimi yaygındır.

TATLI SU KEFALİ AVCILIĞI



Baharın gelmesi ile yapay yemlere büyük ilgi gösteren ve yaz boyunca verimli av verecek olan tatlısu kefalı, sonbahar ile birlikte havaların soğumaya başlamasıyla daha derinlere inmeye


başlayıp, nisbeten daha az aktif olacak ve at çek yöntemindeki yapay yemlere olan ilgisini azaltacaktır. Bu dönemde, yapay yemlere saldırırken ne derece saldırgan, doğal yemlere yaklaşırken de bir o kadar temkinli olduğunu bildiğimiz tatlısu kefalini ağırlıklı olarak solucan ve ciğer ile yakalayabiliriz.

Yazın, bazı tahıllar, civarda bulunan küçük meyveler, ekmek, peynir, bulunulan bölgede tutulabilecek küçük balıklar, balık filetoları vb. yem olarak kullanılabilse de kış döneminde ciğer gibi koku veren yem tercihi av verimini arttıracaktır.

KULLANILACAK TAKIM

Kullanılacak kamış sağlam, sizi yormayacak ağırlıkta, açık alanda avlanacaksanız tercihen 3 mt. ve üzeri uzunlukta seçilmelidir. (Ağaçların arasından ve hemen önünüzdeki bölüme olta atacaksanız kamışın boyunu kısa seçmeniz de fayda vardır.)


Seçeceğimiz makinanın makarası tercihen 0,20-0,30 mm misinadan 100 mt saracak büyüklükte olmalıdır. Makaramızdaki misina kalınlığı 0,25 mm.yi geçmeyecek şekilde seçilmeli, firdöndüden sonraki 90-100 cm.lik bölümde ise mümkün olan en ince misinayı kullanma yoluna gidilmelidir. Asso Double Strength gibi fiyatı da makul olan bir misinanın 0,18mm ve 0,20 mm kalınlıkları tatlısu kefalı için kanımca yeterlidir. (0,18 için 6 kg., 0,20 için 8 kg test değeri bulunmaktadır.)



İğne olarak Mustad 2300 serisi iğneler tercih edilebilir. İstenildiği ile iğne, dikkatli bir şekilde 2 ya da 3 ileri hareketle dış taraftan keskinleştirilerek daha batıcı bir hale getirilebilir. Bu işlem dikkatli yapılmadığı takdirde iğnenin bozulmasına, zayıflatılmasına yol açılabilir

Bu takdirde Mustad 2300 serisinden iğneleri keskinleştirmek için ince bir eğe yardımı


Bir süre kullandığım ve tatmin edici bulduğum 270 R MUSTAD (Kırmızı renk) iğneler de tatlısu kefalinin avcılığı için tercih edilebilir. Ancak bulunduğunuz bölgede kefaller büyükse Mustad 2300 serisi iğneler daha güvenli bir seçim olacaktır.



MUSTAD 2300 SERİSİ 270 R MUSTAD İĞNE (Kırmızı renk)

Seçilecek şamandıranın yeme temkinli yaklaşan kefalin direnç hissetmeyeceği türden, uzun ve ince, kalem tipli ve mümkün olan en küçük boyda olması gerekir. Her ne kadar şamandıranın kıstırmalarla yüklenerek suya battı batacak konumuna getirileceğini bilsek de kullanabileceğimiz en hafif şamandırayı kullanmamız oluşturacağımız takımın avcılığı açısından önemlidir.

Benim kullandığım ve 3 gr. taşıma kapasitesine sahip şamandıranın en küçük boydaki 4 adet kıstırmayla suya battı batacak konumuna getirilmesini sizler farklı taşıma kapasitesindeki şamandıralar ve farklı ağırlıktaki küçük kıstırmalar ile gerçekleştirebilirsiniz. Esas olan, mümkün olan en küçük taşıma kapasitesine sahip, ince, uzun ve kalem tipli şamandırayı küçük kıstırmalar aracılığı ile suya battı batacak konumuna getirebilmektir.



Takıma verilecek derinliği şamandırayı aşağı-yukarı kaydırmak suretiyle avlanacağımız bölgenin durumuna göre belirlemek mümkün olmakla birlikte ideal olan, şamandıranın dik kalacağı bir konumda yemin yerde suyun hareketiyle balığa gösterilmesidir.

Balık yemi aldığı anda ilk direnci şamandıradan alıp iğnenin ağına batması gibi bir süreç, mümkün olan en hafif taşıma kapasitesine

sahip şamandırayı kullanmamız ve onu da kısırmalarla suya battı batacak konumuna getirmemiz nedeni gerçekleşmeyeceği için tasmalamayı şamandıranın hareketine göre bizim gerçekleştirmemiz gerekecektir. Bu nedenle şamandıranın hareketlerini dikkatli bir şekilde izleyip tasmalamayı geciktirmeden yapmak gerekir.

AVLANILACAK YERİN TESBİTİ

Kimsenin yorulmayı, uğraşmayı göze alıp gitmediği yerleri tercih etmek hem av şansını arttıracak hem de kayda değer sonuçlar sağlayacaktır. Bununla birlikte kimsenin olta atmaya değer bulmayacağı kıyıya yakın küçük gölcükleri, ağaç diplerini boş geçmemek gerekir.

YEMLEME

Yemleme, kimi zaman hedeflenen balıkları istediğimiz bölge civarına toplamak, kimi zaman da hedeflenen balığın yeme yönelen diğer balıklardan yemi kapabilmek için ihtiyatı kısmen de olsa elden bıraktığı bir sırada yakalanmasına dönük süreci hızlandıran bir etmendir.

Tatlısu Kefali'nde yemlemeyi pek çok yem ile yapmak mümkün olsa da doğru olan, balığı hangi yem ile yakalamak istiyorsak onunla mazmoz yapmamızdır.

Avlanmak için uygun olduğunu düşündüğümüz gölcükler, ağaç, saz dibi, oyuk vb. gibi yerlerde mazmoz yaptıktan sonra hemen oltamızı suya bırakmayıp 1-2 dakika beklememiz daha doğru olacaktır. Yemleme amacı ile suya attığımız yemlere ilk önce büyüklerine göre daha az temkinli yaklaşan küçük boyda balıklar ilgi gösterecek, hızlı hareketlerle yemleri çalmaya çalışacaklardır. Ardından da (eğer civarda varsa) etrafındaki hareketliliği görüp yemlerin görüntü veya kokusuyla gizlendiği yerden çıkmaya ikna olan avlamaya değer büyüklüktekiler ortaya çıkacaktır. Yemlemeyi yapıp hemen oltayı suya bırakmamız durumunda muhtemelen yemimizi ilk önce küçük kefaller bozacak daha da kötüsü

ufaklardan birisinin iğneye takılarak sudan çekilmesi ile hedeflenen büyük kefal ürkütülecek, mera bozulacaktır. Yemlemeden sonra 1-2 dakika bekleyerek, hem civarda bulunan büyük kefallerin yemlere yönelmesine zaman tanımış, hem de küçüklerin oltaya takılarak merayı bozmasına engel olmuş oluruz.

Yemlemeyi yapıp bir süre sonra oltamızı suya bıraktıktan sonra da şamandıramız sık sık batıyor ve küçük kefaller yemimizi sürekli bozuyorsa bulunan bölgenin bizim için uygun olmadığı, yer değiştirmemiz gerektiği kanısına varmamız gerekir. Büyük kefallerin olduğu bölgelerde, küçükler kısa bir süre haricinde kolay kolay yeme yaklaşamayacağı için küçük balıkların olduğu yerde büyüğün (tesadüfi olarak o bölgeden geçmiyorsa) olmayacağı sonucuna varılabilir. Yine oltamızı bıraktığımız yerde 15 dakika boyunca vuruş alamamamız durumunda yer değiştirmekte fayda olacaktır.

Yukarda tarifini yaptığım olta takımı ile gidebildiğim pek çok farklı özellikli tatlısuda kendimce yeterli sonuç aldım; sizlerin de benzer sonuçları ve daha fazlasını alacağınızdan kuşku duymuyorum. (KAYNAK:Mustafa ÜNALAN)

TİLAPİA VE AVCILIĞI

Tilapia genel olarak ılık su balığıdır. 10 derecenin altındaki su kaynaklarında yaşama olanağı bulamaz. Bu nedenle ülkemiz su kaynaklarında doğal olarak var olan bir balık türü değildir. Sıcak bölgelerde özellikle Güney Asya ve Afrika'da pek çok tilapia türü gerek yemeklik

gerekse akvaryum balığı olarak önem taşır. Bu kapsamda yetiştiriciliği yapılan pek çok tilapia türü vardır. Ülkemizde gerek akvaryumlar için gerekse yetiştiricilik için getirilen türleri bulunmaktadır. Yetiştiricilik Adana bölgesinde damızlıkları kış aylarında seralarda barındırma ve



Resim: Köyceğiz dalyanda tilapia avı.

yaz aylarında üretime alma şeklinde uygulanmak istenmiş ise de tam bir başarı sağlandığı söylenemez. Özetle yetiştirme yaygınlaşamamıştır. Yaptığımız ön denemelerde Ege Bölgesi'nde de kış aylarında öldükleri saptanmıştır. Ilıman bölge balığı olmakla beraber bazı kişiler tarafından

doğal kaynaklarımıza bırakılmış ve buralarda ılık su kaynakları olan bazı göletlerde üreme olanağı bulmuşlardır. Bunlardan bir tanesi de Köyceğiz'deki Dalyan bölgesidir. Her ne kadar Dalyan kış aylarında soğuyan ve bu nedenle balığın kışın yaşama olanağı bulmaması gereken

bir alan ise de Dalyan içindeki ılık su kaynakları yakınlarında kışın barınma olanağı bulmakta ve havalar ısınınca yaz aylarında süratle Dalyan içine dağılmaktadır. Çok hızlı üreyen bir tür olması nedeni ile yaz aylarında Dalyan içerisinde amatör amaçlı bol miktarda tilapia avlamak mümkün olmaktadır. Avcılığı basit olta takımları ile

kolayca yapılabilir. Turistik amaçlı bir avcılık olarak ele alınması ve turistleri eğlendirme bakımından üzerinde çalışılmasının yararlı olacağı düşünülebilir. Bunun yanında Dalyan ekosistemini nasıl etkilediği konusunda bilimsel çalışmalar yapılmasında yarar vardır. Eti iri olanlarında yenilebilir nitelikte olduğu söylenebilir.

15.1.RESİMLER İLE TATLI SU BALIKLARI



Pullu Sazan
Carp (*Cyprinus Carpio*)



Siyah Sazan
Black carp (*Mylopharyngodon piceus*)



Kırmızı Havuz Balığı
Goldfish (*Carassius auratus*)



Gümüş Havuz Balığı
Silver carp (*Carassius auratus gibelio*)



Aynalı Sazan
Mirror carp (*Cyprinus carpio*)



Dere Kayabalığı
Gudeon (*Gobio gobio*)



Kızılkanat
Rudd (*Scardinius erythrophthalmus*)



Gümüş Sazan
Carp fish (*Hypophthalmichthys molitrix*)



Ot Sazanı
Grass carp (*Ctenopharyngodon idella*)



Afanyus
Aphanius (*Aphanius fasciatus*)



Gümüş Balığı (*Atherina*)
Silverside (*Atherina boyeri*)



Yılan Balığı
Eel (*Anguilla anguilla*)



Gökkuşağı Alabalığı
Rainbow trout (*Salmo gairdneri*)



Ankara Çamur Balığı
Angora Loach (*Neomacheilus angorae*)



Çamuka
Mediterranean sand smelt (*Atherina hepsetus*)



Tatlısu Kefali
Chub (*Leuciscus cephalus*)



Yayın
Catfish (*Silurus glanis*)



Dağ Alası
Char (*Salmo trutta macrostigma*)



Gambusia
Gambusia (Gambusia affinis)



Tatlısu Sardalyası,
Freshwater silurid
(Clupeonella abrau muhusi)



Göl Alası,
Lake trout (Salmo trutta lacustris)



Dere Alabalığı,
Brown trout (Salmo trutta fario)



Tatlısu Levreği
Perch (Perca fluviatilis)




Tatlısu Kaya Balığı
Tubenose goby (Proterorhinus marmoratus)



Sudak
Pike perch (Stizostedion lucioperca)

15.2.TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI



Karagöz
Two banded seabream (Diplodus vulgaris)



Sivriburun Karagöz,
Sharpnosed seabream (Diplodus puntazzo)




Eşkına
Brown meagre (*Sciaenops ocellatus*)




Mercan
Couch's seabream (*Pagellus erythrinus*)



Lekeli Mercan
(*Pagellus bogaraveo*)



Kirma Mercan
Axillary seabream (*Pagellus acarne*)



Fangri Mercan
(*Sparus pagrus*)




Çipura
Alyanak, Gilthead seabream
(*Sparus aurata*)



Melanurya
Saddlet seabream (*Oblade melanura*)




Mırmır (Çizgili Mercan)
Çizgili Mercan, Stripped seabream
(*Uthognathus mormyrus*)



Trança
Blue spotted bream (*Pagrus ehrenbergi*)



Sınarıt
Dentex (*Dentex dentex*)



Papağan
Parrot fish (*Sparisoma cretense*)



Kupez
Bogue (*Boops boops*)




Ofroz
Dusky grouper (*Epinephelus guaza*)




Minekop
Shi drum (*Umbrina cirrosa*)




Orkinos
Blufin tuna (*Thunnus thynnus*)



Sarıgöz
Black seabream (*Spondyllosoma cantharus*)



Lahoz
White grouper (*Epinephelus aeneus*)



İzmarit
Picarel (*Spicara smaris*)



İstrongilos
Picarel (*Spicara smaris*)



Çizgili Orkinos
Skipjack tuna (*Katsowonus Pelamis*)



Kılıç
Swordfish (*Xiphias gladius*)



Malta Palamudu
Pilot fish (*Naucrates ductor*)



Palamut Torik
Bonito (*Sarda sarda*)




Uskumru
Mackerel (*Scomber scombrus*)



Tirsi
Twaite shad (*Alosa agone*)



Akya
Leerfish (*Lichia amia*)



İstavrit
Atlantic horse mackerel (*Trachurus trachurus*)



Kolyoz
Chub mackerel (*Chalcalburnus Chalcoïdes*)



Gümüş
Sand smelt atherine (*Atherina presbyter*)



Sardalya
Pilchard (*Sardinella aurita*)



Hamsi
European anchovy (*Engraulis encrasicolus*)



Levrek
Sea bass (*Dicentrarchus labrax*)



Mavi Kefal
Thicklip grey mullet (*Chelon labrosus*)




Has Kefal
Flathead mullet (*Mugil cephalus*)



Papaz
Damsel fish (*Chromis chromis*)




Yazılı Hani
Painted comber (*Serranus scriba*)



Kaya Balığı
Syrman goby (*Neogobius syrman*)



Taşaltı Balığı
Bullhead (*Cottus gobio*)



Büyükbaş Kayabalığı
Bighead goby (*Gobius ponticola*) Kessleri




Gelincik
Shore rockling (*Trachinus araneus*)




Kum Trakonyası
Spotted weever



Trakonya
Greater weever (*Trachinus draco*)



Lipsos
Small scaled scorpion fish (*Scorpaena scrofa*)



İskorpit
Black scorpion fish (*Scorpaena porcus*)



Horozbina
Blenny (*Aldablennius sphynx*)




Berlam
European hake (*Merluccius merluccius*)




Çaça
Sprat, garvock (*Sprattus sprattus*)



Bakalyaro
Blue whiting (*Micromesistius australis*)



Dülger
John Dory (*Zeus faber*)



Kalkan
Turbot (*Psetta maxima*)



Zargana
Grafish (*Belone belone*)



İskarnoz
European barracuda (*Sphyræna sphyræna*)




Dikence
Stickleback (*Gasterosteus aculeatus aculeatus*)



Dikenli Öküz
Armoured searobin (*Peristedion cataphractum*)



Dikenli Kirlangıç
Red Gurnard (*Aspitrigla cuculus*)



Üzgün
Common Dragonet (*Callionymus lyra*)



Kirlangıç
Tub Gurnard (*Trigla lucerna*)



Mazak
streaked gurnard (*Trigla lineata*)




Kanatlı Kirlangıç
Flying Gurnard (*Cephalacanthus volitans*)



Camgöz Köpekbalığı
Tope shark (*Galeorhinus galeus*)



Mavi Köpekbalığı - Pamuk
Blue shark (*Prionace glauca*)




Mahmuzlu Camgöz Köpek Balığı
Tope shark (*Galeorhinus galeus*)



Keler
Angel shark (*Squatina californica*)



Common stingray (*Dasyatis pastinaca*)




Aybalığı
Sunfish (*Mola mola*)



Elektrik Balığı
Marbled electric ray (*Torpedo sinuspersici*)



Fener
Black bellied angler (*Lophius budegassa*)



Pisi
Flounder (*Pseudopleuronectes americanus*)



Uçan Balık
Flying fish (*Parexocoetus brachypterus*)



Mezgıt
(*Merlangius euxinus*)



Barbunya
Goatfish (*Mullus barbatus*)



Kayış Balığı
Cusk eel (*Ophidion barbatum* Linnaeus)




Vatoz
Thornback ray (*Raja clavata*)



Tekir
(*Mullus surmuletus*) Stripped red mullet



Kağıt balığı
Ribbon fish (*Trachipterus trachipterus*)



İskorpit, Sökan balık, Vuran balık
Black scorpion fish (*Scorpaena porcus*)



Deniz Alası
(*Salmo trutta labrax*)




Kıkla Lapin
Ballan wrasse (*Labrus bergylta*)



Ördek Lapin
Cuckoo wrasse (*Labrus mixtus*)




Kömürcü Kayası
Black goby (*Gobius niger*)



Kedi Balığı
Small-spotted catshark
(*Scyliorhinus cacicula*)




Dil Balığı
Common sole (*Solea solea*)



İskorpit Hanisi
Wreckfish (*Polyprion americanus*)



Kurbağa Balığı
Atlantic stargazer (*Uranoscopus scaber*)



Saz Kayası
Grass goby (*Zosterisessor ophiocephalus*)



Berber Balığı
Swallowtail seaperch, (*Anthias anthias*)



Müren
Murene (*Mürene helenae*)




Zurna Balığı
Atlantic lizardfish (*Synodus saurus*)



İspari - İsparoz
Annular sea bream (*Diplodus annularis*)




Lüfer
Bluefish (*Pomatomus saltator*)
Büyüklüğüne göre Defneyaprağı,
Çinakop, Sarıkanat, Lüfer, Kofana




Sarpa
Goldline bream (*Boops salpa, salpa salpa*)



Mıgır
Conger Eel (*Conger conger*)



Sarı Kuyruk,
(*Seriola dumerili*)



Sarıgöz
Black seabream (*Spondylusoma cantharus*)